(terminale) Niereninsuffizienz und palliativer Bedarf

Dr. Wolfgang Clasen
Palliativstation

Ich habe keine Interessenkonflikte

Gliederung

1. Niereninsuffizienz –
Indikation für Palliativmedizin (! ?)
2. Diagnose
3. Entscheidungen
4. Besonderheiten der Symptomkontrolle
  - Übelkeit
  - Polyneuropathie
  - Luftnot
  - Dialyse
  - Terminalphase

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Terminale Niereninsuffizienz in Deutschland

- Etwa 100. 000 Patienten in Therapie
- Davon 75.000 in Dialysebehandlung
- Zuwachsrate 5 – 8 % pro Jahr
- Alter bei Dialysebeginn steigt

➤ *Sterbewahrscheinlichkeit* > 50 % in 5 Jahren

wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Stadien der Niereninsuffizienz

Stadium	GFR ml/min	% der Bevölkerung USA	Deutschland*
1	> 89	5,7	
2	60-89	5,4	
3	30-59	5,4	ca. 4 Millionen
4	15-29	0,4	ca. 300.000
5	< 15	0,4	ca. 300.000

* hochgerechnet

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Das Urinvolumen

< 200 ml	Anurie
200 – 400 ml	Oligurie
400 – 4000 ml	Normurie
> 4000 ml	Polyurie

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Blutentnahme bei Palliativtherapie in der Niereninsuffizienz ?

- **Sinnvoll für :**
  - *Prognoserstellung*
  - *Arzneimitteldosierung*

Harnstoff

Abhängig von der Filtration, mehr jedoch von:

- Proteinzufuhr
- Hydratationszustand

Gradmesser der urämischen Intoxikation

Ist osmotisch wirksam

Korreliert mit Somnolenz

Harnstoff überproportional zum Kreatinin erhöht :

DEHYDRATATION

DD: Intestinale Blutung

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Die Diagnose: Das Problem mit dem Kreatinin

- Endprodukt des Muskelstoffwechsels
- Ungiftig
- Nicht osmotisch wirksam
- Hängt von der Muskelmasse ab
- Wird evtl. tubulär sezerniert

**Palliativpatienten haben falsch „zu gutes“ Kreatinin
Daher stimmt die CKD Epi-Formel nicht**

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse
Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Cystatin C

13,4 kD

Proteasenstoffwechsel

Ab dem Kindesalter einsetzbar

Unabhängig von der Muskelmasse

Vollständig filtriert und tubulär rückresorbiert

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Cystatin C vs. Inulin-clearance

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Stadium   Symptome der Urämie

1	Hypertonie
2	Ödeme
3	Anämie
	Knochenschmerz
4	Azidoseatmung, Juckreiz, Neuropathie, Singultus
	Krämpfe, Lähmungen, Lungenödem
5	Erbrechen, Somnolenz / Koma
	Kachexie, Blutungen, Krampfanfall

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Maria D. aus Neuwied
100. Geburtstag in 2016

Belastung durch Dialysebehandlung

- Vorgegebener Lebensrhythmus, feste Termine
- Kreislaufreaktionen / Krämpfe
- Trinkdisziplin
- Essdisziplin
- Hohe Tablettenlast
- Frustration (Dialyse beseitigt Urämie, nicht aber Alterungsprozess)
- Probleme des Dialysezugangs

Alternativen (keine NTX möglich)

- Hämodialyse 3 mal pro Woche 4 – 6 Std.
- Peritonealdialyse kontinuierlich
- Intermittierende Peritonealdialyse (nachts)
- „Incremental dialysis“ 2 mal 3 Std. pro Woche

➤ Palliative Symptomkontrolle

Praktische Pharmakologie Abbauwege

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

➤ Wasserlösliche Stoffe

➤ Fettlösliche Stoffe

Vorsicht:
aktive wasserlösliche Metabolite

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse
Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Beispiel Morphin

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Halbwertszeit 2,4 Stunden

Aktiver Metabolit: *Morphin-6-Glucuronid*
(wasserlöslich) HWZ 2,6 Stunden

Cave:

Bei terminaler NI : 30 Stunden !

Voller Effekt (steady state) erst nach 5 Tagen

➤ Empfehlung:

GFR < 50 ml/min

Dosis 75 %

GFR < 10

50 %

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Hydromorphon „problemlos“ bei NI

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Keine Metabolite mit langer HWZ

Hydromorphon-3-Glukoronid ist neurotoxisch

Bei GFR < 30 ml/min:

AUC 4,4 fach größer

HWZ 39,4 Stunden (normal 14.8 Std.)

Wird durch Dialyse entfernt

2 mal tägliche Gabe retardierter Tabl.

Daher:

Geringere Anfangsdosierung bei NI

1 mal Gabe möglich

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für
Innere Medizin und
Nephrologie/Dialyse
Palliativstation
wolfgang.clasen@hjk-

Benzodiazepine

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

- Beispiele: Diazepam [Valium®, Midazolam®]
- Zahlreiche nierengängige Metabolite
- Teilweise bis 7 Tage Überhang nach Absetzen

➤ **Lorazepam [Tavor®]**
kumuliert nur in höchsten Dosen

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für
Innere Medizin und
Nephrologie/Dialyse
Palliativstation
wolfgang.clasen@hjk

NSAR und Niere

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

- Nephrotoxischer Effekt: Diurese
- Auch bei Anurie: Starke ulzerogene Potenz

➤ **Novaminsulfon zeigt geringste renale und gastrointestinale Nebenwirkungen bei NI**

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

<http://www.dosing.de/Niere>

Copyright © 1998 - 2019

Abt. Klinische Pharmakologie & Pharmakoepidemiologie,
Universitätsklinikum Heidelberg

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Gastrointestinale Urämiesymptome

Ursachen:

Toxine (Harnstoff)

Magen / Darmgeschwüre

Hyperkaliämie

Azidose

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation
wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Therapie (Kombination!)

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Haloperidol   **0,5 – 1 mg**   *p.o., s.c., i.v., buccal*
[Cave: Harnretention]

Dimenhydrinat   **50 – 400 mg**   *p.o. rektal i.v.*

Granisetron   **2 mal 1mg**   *p.o. i.v.*

Mirtazapin (50% Dosis)   **15 mg**

Protonenpumpenhemmer [Pantoprazol]

Bikarbonat [Bicanorm, Kaisernatron]

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für
Innere Medizin und
Nephrologie/Dialyse
Palliativstation
wolfgang.clasen@hjk-
muenster.de

Therapie des urämischen Singultus

- Carbamazepin (normal dosiert)
- Baclofen (initial 5 mg ; **kumuliert**)

Urämiesymptom Blutungsneigung

Nasenbluten

- Hauteinblutungen
- Innere Blutungen

Therapie:

Plättchenhemmer absetzen !

Vitamin C 1 – 3 g/die

Tobotamp®

[Desmopressin (Minirin®)]

Urämiesymptom P N P

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Ursachen

Grundleiden (Diabetes, Myelom)
iatrogen (Chemotherapie)
Urämietoxine (Marker Harnstoff)
Mangel wasserlöslicher Vitamine

Therapie   **Substitution bei Mangelzustand**
Antikonvulsiva
Antidepressiva
(Analgetika)

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse
Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Pregabalin [Lyrica®] bei NI

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

- HWZ normale GFR   6,3 Stunden
- Clearance 20 ml/min   **31,5 Std.**
- 4 Std Hämodialyse eliminieren 50 %
- Empfehlung:
Dosis stark reduzieren (20 %)
Dosisintervall verlängern

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und
Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-
muenster.de

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Alternative bei PNP und NI

Gabapentin

wasserlöslich, effektiv dialysierbar

Kreatinin-Clearance [ml/min]	mg/die
≥ 80	900 - 3600
50 - 79	600 - 1800
30 - 49	300 - 900
15 - 29	150 - 600
	(300 mg jeden zweiten Tag)
< 15	150 - 300
	(300 mg jeden zweiten Tag)

Hämodialysepatienten: **300 mg nach jeder HD**

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Weitere Alternativen

Imipramin [Tofranil® u.a.]	normal dosieren
Duloxetin [Cymbalta®]	bis GFR 30 ml/min
Topiramamat [Topamax®]	ab GFR < 60 ml/min reduzieren
Carbamazepin	normal dosieren

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für
Innere Medizin und
Nephrologie/Dialyse
Palliativstation
wolfgang.clasen@hjk-

Urämiesymptom Juckreiz

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Vitamin D - mangel
Urämietoxine
Hohe Phosphat- und Parathormonlast
Exsikkierte Haut

Therapie:

UV Licht / Vitamin D (-hormon)
Harnstoffhaltige Cremes und Lotionen
Neuroleptika

Cinacalcet

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Urämiesymptome Ödeme / Luftnot

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Unterscheide:
Retentionsödeme / nephrotische Ödeme

Therapie

Sequentielle Nephronblockade
(Schleifendiuretikum, Spironolakton, Thiazid)

Pleura- / Ascitespunktion

Kompressionstherapie, Lymphdrainage

Opiate (Hydromorphon)

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Dialyseindikation überprüfen

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

- 1) Ist Lebensverlängerung (noch) gewünscht ?
- 2) Können Urämiesymptome anders beherrscht werden ?
- 3) Überwiegt Symptomerleichterung die Belastungen durch die Therapie ?

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Wenn Dialyse sein soll: Dialysedauer und Dosis anpassen

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

- 2 – 3 Stunden HD reichen zur Symptomkontrolle
- Assistierte Peritonealdialyse
z.B. 2 Beutel Icodextrin [Extraneal®] / Tag

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für
Innere Medizin und
Nephrologie/Dialyse
Palliativstation
wolfgang.clasen@hjk-

Phosphatbinder rechtzeitig absetzen

- Keine Indikation in palliativer Situation
- Ileus-Gefahr / schwere Obstipation
- Juckreiz symptomatisch bekämpfen
  - Antihistaminika
  - Lichttherapie
  - Kühlende Lotionen mit Harnstoff

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation
wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Wie lange wird es dauern bis... ?

Terminale Niereninsuffizienz **anurisch**:

- 3 – 7 Tage
- Bei erhaltener Diurese....?

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Welche Probleme sind zu erwarten ?

- **Überwässerung**
- **Hyperkaliämie / Erbrechen**
- **Hypertensive Krise**
- **Blutungen**
- **Perikarditis**
- **Krampfanfall**
- **Koma**

Wichtig in der Terminalphase 1

- **Angehörige gut informieren (Azidoseatmung im Koma)**
- **Mundpflege besonders bedeutend**
- **Wenig Salz**
- **Kühle Getränke mit Geschmack (Eis)**
- **Lagerung**

Wichtig in der Terminalphase 2

- **Antiemetika obligat**
  - Haloperidol
  - Dimenhydrinat [Vomex®]

- **Keine routinemäßigen Diuretika**

- **Antihypertensiva nicht abrupt absetzen**
(zentrale α -Blocker, β -Blocker) **evtl. Clonidin s.c.**

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Was soll man in der Terminalphase beachten ? 3

- **Delirbehandlung eher mit niedrigpotenten Neuroleptika**
(Promethazin)

- **Bei Anfällen Lorazepam in verlängerten Intervallen**

- **Kalkulierte Morphingabe**
  - Z.B. Hydromorphon, Buprenorphin

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

Entscheidungen

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

- Information und Beratung zu Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht sollte selbstverständlich sein
- Jede einzelne Dialyse ist eine erneute, freiwillige Entscheidung
- Integration statt Abgrenzung
- Weder juristisch noch ethisch- moralisch ist die Beendigung einer Dialysetherapie verwerflich

NB:

- zu jeder Aufklärung über Dialyse gehört das Angebot zu gegebener Zeit aufzuhören.

Dr. Wolfgang Clasen, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie/Dialyse Palliativstation wolfgang.clasen@hjk-muenster.de

HERZ-JESU-KRANKENHAUS
MÜNSTER-HILTRUP

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jetzt nehme ich mir Zeit für Ihre
Rückfragen!

wolfgang.clasen@hjk-muenster.de